

Корь: симптомы, профилактика, вакцинация

Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с корью в России: заболевание выявили в 44 регионах страны. Три московских вуза перевели студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори. С начала этого года отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки по кори и в Санкт-Петербурге. С января по апрель выявлен и подтверждён 31 случай кори, в том числе 13 среди детей.



Корь — это респираторная инфекция, которая вызывается вирусом. Она передается воздушно-капельным путем, и после контакта с больным вероятность инфицирования составляет почти 100%. По сообщению Роспотребнадзора, от одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.

Инфекция считается «детской», но ею можно заболеть и во взрослом возрасте. Причём взрослые переносят болезнь намного тяжелее. Чаще всего болеют дети раннего возраста и люди от 35-40 лет. Для будущих матерей и пациентов с хроническими патологиями корь наиболее опасна.

Среди симптомов заболевания: высокая температура до 40 градусов,

насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Лечение от кори только симптоматическое. Последствия перенесенного заболевания могут быть очень тяжелыми: пневмония, бактериальное осложнение, слепота, ухудшение слуха и даже отёк головного мозга. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

Как сообщает Роспотребнадзор, плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, которые не имеют сведений о прививках, происходит до 35 лет. До 55 лет могут привиться люди, входящие в «группы риска»: работники лечебно-профилактических и образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, а также работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом. Необходимо иметь две прививки против кори, которые должны быть документально подтверждёнными. Те взрослые, которые не получили вакцину в детстве, прививаются двукратно с интервалом не менее трёх месяцев между прививками.

Человек получает устойчивый иммунитет к инфекции примерно на 20 лет. А после этого рекомендуется повторять прививку от кори согласно графику вакцинации. Перед этим нужно сдать кровь на уровень антител. При отсутствии антител показана вакцинация в любом возрасте, она проводится однократно по медицинским показаниям, которые определяет терапевт.

Всем гражданам, не имеющим информации о перенесённом заболевании корью или о наличии вакцинации от кори, необходимо проверить «Наличие антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови». Для проверки осуществляется забор крови из вены. Данное обследование проводится только на платной основе и не входит в перечень по ОМС. Сдать кровь можно в городской поликлинике № 76 в будние дни или в коммерческих лабораториях города, — объяснила главный врач поликлиники № 76 Оксана Алешко.

Записаться можно по телефону (812) 246-73-13.

Внимательно относитесь к своему здоровью, берегите себя и своих близких.

Дата публикации: 2023.04.25

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям